

**LAS TÉCNICAS Y LOS SISTEMAS DE CULTIVOS
EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE**

Elisa Matoso Melián

1. INTRODUCCIÓN

El paisaje agrario que presentan las islas de Fuerteventura y Lanzarote obedece en parte a la pervivencia de técnicas y sistemas de cultivos tradicionales.

Pretendemos con esta ponencia abordar las diferentes técnicas y sistemas de cultivos que se emplean en el agro mayorero y conejero. Verificamos por un lado, que los condicionantes naturales sólo imposibilitan en parte un mayor incremento de las fuerzas productivas en las islas, pues el actual estado de las técnicas agrícolas, en general, y la existencia de algunos elementos ecológicos beneficiosos (por ejemplo elevada insolación, disponibilidad de lapillis, de jable, etc.), en particular, podrían permitir una agricultura de alta productividad y considerable rendimiento (sobre todo de tomates para Fuerteventura y de cebolla para Lanzarote). Por otra parte, partimos de la necesidad de establecer unas pautas y medidas con respecto al secano-regadío. Puesto que a nuestro entender estas dos agriculturas van muy unidas, y no como se ha querido demostrar presentándolas como dos realidades bien distintas. Como apunta Alejandro González y Ana Betancort: «(...) los diversos tipos de agriculturas son la resultante de determinadas formas de producción. En cualquier caso hay que manifestar que no es la yuxtaposición de dichos modos los que conforman la actual Formación Social de las islas, sino por el contrario la articulación de los mismos, donde el modo de producción capitalista es dominante y establece con el resto unas relaciones sociales y de producción concretas, conformando en conjunto una totalidad, que en ningún momento podemos entenderla en el sentido hegeliano, sino que este todo constituye una unidad compleja estructurada por las diferentes instancias que conforman a los diversos modos de producción, aunque es el nivel económico quien determina finalmente dicha globalidad»¹.

Los espacios mayoreros y conejeros se hallan articulados y vienen explicados por las relaciones sociales y de producción que configuran la Formación Social Canaria y de acuerdo con el planteamiento de articulación

1. BETANCORT BETANCORT, A., Y GONZÁLEZ MORALES, A.: «Evolución reciente y estado actual de las estructuras agrarias de la Isla de Lanzarote». *II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura*. Tomo II. Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. Arrecife, 1990 (pág. 51).

de los modos de producción efectuada para la agricultura canaria por María del Carmen Díaz Rodríguez y J. Fco. Martín Ruiz, donde establecen al menos tres formas de producción diferentes dentro del contexto agrario regional y donde el modo de producción capitalista es dominante y determinante relegando a un segundo plano a los restantes (precapitalista y subcapitalista)².

El modo de producción capitalista es dominante en la Formación Social Majorera y Conejera, controlando los circuitos de distribución y comercialización de los productos, aún así, en dichos espacios se pueden reconocer dos formas de producción, una meramente precapitalista (modo de pequeña producción mercantil) con un policultivo de subsistencia, y otra subcapitalista, con la circulación exterior del producto.

2. LAS TÉCNICAS DE CULTIVO

Son muy diferentes en los de secano (destinados a la subsistencia), que en los de regadío (orientados preferentemente hacia el mercado exterior).

Para el caso de Fuerteventura, el carácter general de los cultivos en la isla es el «secano», de escasa importancia económica, en franca crisis desde bien entrado los años 60 y principio de los 70. El fin primordial de estos cultivos, consiste en cubrir las necesidades básicas de la familia campesina, donde el trabajo es muy intenso y continuado a lo largo de todo el período agrícola, caracterizándose por una casi absoluta inexistencia de maquinaria provocando, en consecuencia, unas arcaicas y tradicionales técnicas. Y esto se explica en función de los escasos rendimientos que proporciona tal agricultura.

Frente a estas explotaciones, tenemos aquellas cuya producción está orientada al mercado exterior (subcapitalista y capitalista), que se caracterizan por el empleo de riego por goteo, arenado de la plantación y dedicación casi exclusiva al cultivo del tomate. No obstante, la superficie dedicada al regadío es bastante baja, ubicándose una buena parte de ésta en la zona sur.

Para Lanzarote, sucede lo mismo pero con una clara diferencia, y es que son explotaciones típicas todas ellas de secano, donde encontramos del mismo modo, aquellas que producen sólo para consumir y otras las semicapitalistas destinadas al cultivo de exportación —la cebolla—, con unos niveles productivos muy bajos y fuertemente arcaicos.

Las técnicas de cultivo empleadas para Lanzarote y Fuerteventura no siempre son las mismas, reconociéndose diferentes maneras de cultivar las

2. DÍAZ RODRÍGUEZ, M.^a DEL CARMEN, Y MARTÍN RUIZ, J. F.: *Los modos de producción y su articulación en la geografía canaria*. Anuario del Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras, La Laguna (Tenerife), 1981 (págs. 138-193).

tierras, las cuales, siguiendo un criterio cronológico en la aparición de éstas —criterio, por otro lado, perfectamente criticable—, son las siguientes:

—Los cultivos en suelo natural

Son los más antiguos y su preparación se realiza con labores rudimentarias. Los cultivos, más representativos son los cereales y los garbanzos. Esta práctica empleada en el pasado, ha sido reemplazada por otras.

—Los cultivos en gavias

Corresponde a suelos que se han preparado en forma de artesa, con bordes realzados (caballones), con el objeto de ser inundadas con agua. Se disponen las gavias en los márgenes de los barrancos, con un tomadero, que suele ser un muro de tierra y piedras dispuestos en ángulo en relación con el lecho del barranco, y capaz de recoger el agua y conducirla a la gavia. Una vez llena la gavia, se deja que el agua se filtre. Suelen ser suelos de tierra profunda. Cuando las gavias han recogido agua suficiente, la cosecha es segura y abundante. No siempre llueve lo necesario para llenar todas las gavias dependientes de una «rosa» (conjunto de gavias). Para Fuerteventura, esta labor no es general en todas las explotaciones, cultivándose cereales y leguminosas. Esta técnica de cultivo ha sido abandonada casi por completo en Lanzarote, debido sobre todo, al escaso rendimiento, localizándose en las zonas más antiguas de la isla y se cultivan los mismos productos que en Fuerteventura.

—Los cultivos en suelos arenados artificialmente

Se emplea el mismo procedimiento para las dos islas. Se cubren los suelos con una capa de arena volcánica (lapilli) de 10 a 15 cm. de espesor. Fernández Lavandera y Pizarro Checa, comentan que la acción beneficiosa del enarenado es debida a varios factores, reseñándose seguidamente los principales:

- eliminación de la salinidad y alcalinidad
- elevación de la temperatura del suelo
- aumento del desarrollo radicular de las plantas³. No todos los «arenados» son iguales, estas cualidades cambian por las propias condiciones y características del arenero. Hay de diferentes colores, desde un negro azabache hasta un marrón rojizo. La vida media de un arenado se establece en torno a diez años.

3. FERNÁNDEZ LAVANDERA, O., y PIZARRO CHECA, A.: «Almería: la técnica del enarenado transforma un desierto». *Revista de Estudios Agro-Sociales*, n.º 15, abril-junio, 1981. Año XXX. Publicación trimestral del Instituto de Relaciones Agrarias. Madrid (págs. 37, 43, 44).

Fuerteventura no ha sufrido erupciones históricas pero tiene bastantes conos volcánicos con arenas apropiadas que se pueden explotar. En estos momentos, hay cultivados con arena volcánica grandes sectores, y otros tantos están en fase de preparación. Lo cierto es, que el porvenir agrícola majorero puede estar asegurado por esta técnica de cultivo, es decir, enarenando sus campos.

Algunos cultivos experimentales, pongamos por caso, el de Henequén, han sido sometidos a enarenados, aunque sobre todo se cultivan hortalizas. Este aprovechamiento da a los cultivos unos rendimientos y productividades mayores que los del suelo natural. Pero sin duda alguna, el cultivo que ha experimentado una mayor evolución bajo la técnica del «arenado» es el tomate, aunque esta práctica también se emplea para otros cultivos, pero es con el cultivo de esta solanácea con el que se alcanza su mayor significación.

Los enarenados artificiales conejeros se han convertido en una técnica de cultivo esencial para la agricultura isleña, se encuentran dispersos por la totalidad de la superficie de la isla. Los productos principales que se cultivan son la cebolla, sandía, judías, lentejas, melón, tomate, etc. Y una de sus ventajas es la rápida adaptación de todo tipo de cultivos a las propiedades que posee la capa del picón. Pero para el caso de Lanzarote no se puede dejar de mencionar otras dos técnicas: los cultivos sobre jable y los cultivos en enarenado natural. La primera, importante por el cultivo de la batata, fue uno de los más rentables del agro conejero por su comercialización, aunque en la actualidad ha descendido en proporciones muy considerables. Esta técnica lo conforma arena de origen orgánico, distinguiéndose dos tipos, el jable puro, es la mezcla de arena y arcilla y los suelos arcillosos cubiertos de arenas voladoras, corresponde a este tipo el cultivo de la batata. Con respecto al segundo, quizás el más significativo por su sistema de arenados en su modalidad natural (también el artificial), destinado al cultivo y aprovechamiento de la viña. Consiste en la rápida filtración del agua sobre los terrenos recubiertos de una capa de arena volcánica, manteniendo una temperatura uniforme.

—Los cultivos de regadío

Vamos a hablar sólo para el caso de Fuerteventura, puesto que en Lanzarote, no se emplea esta técnica de cultivo.

En la isla majorera, junto con el arenado, se coloca la instalación del riego por goteo, constituyendo ambos un auténtico factor innovador para el arcaico agro majorero.

En los últimos años la perforación de los pozos de poca profundidad, en los valles de la isla, está suministrando un caudal bastante apreciable que se ha destinado al riego durante la zafra del cultivo del tomate.

El tomate, tanto por su producción y rentabilidad, como por su extensión superficial, es el principal cultivo de la isla. Se realiza en régimen de regadío

con un sistema de riego localizado (por goteo), suponiendo un gran revulsivo por el ahorro en el consumo de agua. Otro cultivo importante de regadío es la alfalfa.

3. LOS SISTEMAS DE CULTIVOS

Podemos dividir los sistemas en precapitalista por un lado y, en subcapitalista y capitalista propiamente dicho, por otro.

Conviene analizar ambas islas por separado.


Respecto a la precapitalista, en Fuerteventura podemos afirmar que las adversas condiciones climáticas y la crisis en la que se encuentra sumida la agricultura de subsistencia, restringe, en gran medida, la gama de cultivos que se desarrollan bajo esta forma de producción en el agro mayorero.

En cambio los sistemas de cultivo subcapitalista y capitalista cosechan una gama de cultivos muy reducidas, el principal es el tomate y en menor medida la alfalfa.

Los principales cultivos por extensión, son los cereales, aunque éstos se han reducido considerablemente con respecto al pasado (vid gráfica n.º 0 y vid cuadro n.º 1). No obstante, es la cebada la que ha sufrido el mayor retroceso. Los garbanzos son la única leguminosa, con una superficie de 115 Has. Mientras el resto de éstas sólo mantienen una presencia testimonial. Las papas reducen igualmente su superficie a menos de la mitad, cultivándose únicamente las variedades extratempranas y tempranas. La producción se destina al mercado interior.

Gráfico n.º 0

SUPERFICIE Y EXPLOTACIONES DE 1968 Y 1984



Cuadro n.º 1

Superficies por términos municipales en la Isla de Fuerteventura, año 1977**Secano**

	Superficie total municipal (Ha.)	Total superficie secano (Ha.)	%
Antigua	25.165	25.008	15,1
Betancuria	10.420	10.400	6,3
La Oliva	35.550	35.524	21,5
Pájara	38.368	37.853	22,9
Pto. Rosario	29.092	28.731	17,4
Tuineje	27.742	27.199	16,5
Total	166.337	164.715	100,0

Regadío

	Total superficie regadío (Ha.)	%
Antigua	157	9,5
Betancuria	20	1,2
La Oliva	26	1,6
Pájara	515	31,7
Pto. Rosario	361	22,2
Tuineje	543	33,4
Total	1.622	100,0

Fuente: *Dossier de la Isla de Fuerteventura*. Elaboración propia.

Excluyendo el tomate, el rendimiento de las hortalizas es mínimo en la producción final agraria.

En referencia a las explotaciones, podemos apreciar una acusada diferencia entre los distintos años. Con un notable descenso en la importancia de las mismas.

La distribución de los cultivos por la isla no es en absoluto homogénea. Los cereales y leguminosas están mejor representados en el norte (Municipio de La Oliva). Mientras en el sur priman las hortalizas, sobre todo, el cultivo del tomate. Asimismo, la superficie de forrajes es ostensiblemente mayor en esta comarca que en la anterior.

Como se ha constatado, el cultivo del tomate es el más importante de la isla majorera, sobre todo desde un punto de vista económico. En efecto, ya hemos reflejado que éste, se cultiva bajo la forma de producción capitalista, por lo que creemos, que sería interesante mencionar el sistema que se utiliza para su cosecha, pues si bien en el pasado existieron otros sistemas para dicho cultivo, en la actualidad el que se utiliza es el sistema de «bandejas

compartimentadas». Según manifiesta Alejandro González, el proceso es el siguiente⁴:

«Se utiliza el sistema de “bandejas compartimentadas”, cuyas medidas son de 70 x 40 y que acogen a 275 semillas, desarrollándose éstas por el sistema del “enanismo”. Consiste en colocar la semilla en un recipiente o “cajotón” de la bandeja, donde previamente se ha depositado la turba. La planta sólo desarrolla sus raíces que crecen muchísimo. Sin embargo, el tallo no crece en altura pero sí se fortalece, ésta técnica nueva permite controlar el crecimiento de la planta durante el mes que está en el semillero; la era ha sido abandonada igualmente en favor del invernadero, que utiliza el sistema de riego localizado (aspersión) de una lluvia muy fina, para que no dañe el tallo y las hojas de las pequeñas plantas, regándose una vez al día, siendo por lo tanto el consumo de agua menor que en el sistema tradicional. El consumo de turba, y de todos los elementos que constituyen el capital circulante, es bajo. Únicamente las inversiones en capital fijo son mayores, pero quedan rápidamente amortizados por el inferior coste de producción frente al sistema tradicional. Este sistema se está imponiendo en la isla con una fuerza realmente abrumadora, y no es de extrañar que en muy pocos años todos los semilleros se realicen bajo dicho sistema, por las obvias ventajas que el mismo ofrece».

Por otro lado está, la implantación del sistema de riego por goteo, en la actualidad es casi unánime, debido al ahorro que supone el preciado recurso. Este sistema es enormemente provechoso, pues, no sólo reduce considerablemente el consumo, sino además dicho sistema aminora la tensión de la planta, mantiene la humedad, y puede operar con agua de altos índices de salinidad. Son los Municipios de Tuineje, Antigua y Pájara, las principales áreas tomateras de la isla, sobre todo, el primero de ellos. Por lo que, la expansión del riego por goteo, así como la introducción de nuevas técnicas en los semilleros y también de semillas híbridas altamente productivas, y resistentes a las condiciones climáticas de la isla, nos conduce a pensar en un halagüeño futuro para dicha agricultura.

Ya hemos mencionado que el modo de producción capitalista es dominante dentro de la Formación Social Canaria y por ende en la majorera y conejera. Pero para Lanzarote, su incidencia espacial es mucho menor, con unos índices bastantes bajos, pues sólo está representado sus canales de producción, distribución y comercialización en parte de la viña y en las plantas ornamentales y hortalizas. En este sentido son los de pequeña producción mercantil y el subcapitalista, los que cuentan con un mayor impacto espacial,

4. GONZÁLEZ MORALES, A.: «Sistemas y técnicas de cultivo en la Isla de Fuerteventura». *Anuario de Estudios Atlánticos*, n.º 35, Madrid, 1989 (págs. 261-190).

ocupándose el primero de los productos de subsistencias y abastecimiento del mercado interior; y el segundo hace lo propio con los cultivos de exportación.

Las formas de producción precapitalistas (pequeña producción mercantil) han reducido en la actualidad bastante su superficie. Sus cultivos son los cereales, que si en un pasado tuvieron gran importancia, dominando de forma clara el trigo y la cebada, en la actualidad su espacio es ínfimo; por otro lado, tenemos las leguminosas destinadas al abastecimiento de la familia campesina, destacando los garbanzos, las lentejas, las judías y arvejas, situándose sobre todo en los municipios de Teguiise y Haría.

La superficie de cultivos en régimen de secano es reducida (vid cuadro n.º 2), obteniéndose unos niveles muy bajos en la producción final agraria.

Cuadro n.º 2
Superficies por términos municipales en la Isla de Lanzarote, año 1984

	Superficie municipal (Ha.)	Superficie secano (Ha.)	%
Arrecife	2.395	—	—
Haría	10.741	2.171	28,2
San Bartolomé	4.077	903	11,7
Teguiise	26.221	3.397	44,1
Tías	6.398	1.219	15,8
Tinajo	13.530	—	—
Yaiza	27.460	—	—
Total	90.460	7.690	100,0

Fuente: *Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*. Elaboración propia.

La otra forma de producción de mayor impacto espacial como ya hemos mencionado es la subcapitalista, y reafirmando lo que ya comentaba en su momento Alejandro González respecto a la importancia de dicha forma de producción, «pues si bien la comercialización del producto forma parte plenamente de los circuitos capitalistas no ocurre así con el proceso productivo, donde la escasez de inversión, la baja composición orgánica del capital, el empleo de mano de obra familiar, donde la dedicación a tiempo parcial es un hecho generalizado, así como la baja mecanización y la práctica de técnicas culturales arcaicas nos indican que estamos ante una forma de producción que se encuentra a caballo entre la netamente capitalista y la de pequeña producción mercantil»⁵.

Los principales productos que se cultivan bajo esta forma de producción son la cebolla, batata, uva, cochinilla y también el tomate. Existen otros pro-

5. GONZÁLEZ MORALES, A., y BETANCORT BETANCORT, A.: *Op cit* (pág. 75).

ductos agrícolas, pero no tienen ninguna trascendencia en cuanto al volumen de producción.

Excluyendo a la cebolla, el rendimiento de los restantes cultivos ha disminuido muchísimo en la actualidad.

Por ejemplo, la batata pierde paulatinamente la superficie cultivada, en las campañas 1983/84, 1984/85 y 1987/89, pasando de las 500 a las 100 has. anuales⁶. El Reino Unido era un buen destino para la exportación de la batata en esas fechas, hoy día, su producción se destina al consumo en los mercados interiores del Archipiélago. Sus zonas principales son Teguisse y San Bartolomé.

Otro cultivo que tuvo un gran protagonismo en la isla fue la cochinilla. Su superficie se estima en 215 has. en las zonas de Mala y Guatiza. Si en el año 1983 se exportó 52.691 kg., en el año 1987 fue de 28.722 kg. para ya en el año 1992 descender hasta los niveles mas bajos⁷.

Como se ha constatado, el cultivo de la cebolla es el más importante de la isla conejera, sobre todo desde el punto de vista económico. Se cultiva bajo la forma de producción subcapitalista-capitalista y las zonas donde se encuentra ubicada son Tinajo, Tías y Teguisse. Como hicimos para el cultivo del tomate, creemos necesario mencionar las variedades, éstas son «Lanzarote», «Babosa» y «Blanca temprana», aunque es la primera variedad la que más se cultiva.

Se establece una clasificación en función de la época de plantado y recolección, distinguimos tres tipos:

- 1ª. Cebolla temprana o de ciclo corto, la plantación se realiza entre agosto y septiembre, mientras que la recogida tiene lugar los meses de marzo y junio.
- 2ª. Cebolla de ciclo medio, con similares fechas de plantación y recogida que la primera.
- 3ª. Cebolla tardía, cuya siembra tiene lugar en enero y febrero y su recogida es a partir de julio, llegando incluso hasta octubre.

La variedad «Lanzarote» constituye la de primer y segundo ciclo, mientras que la tercera etapa la cubre la denominada «cebolla en grano»⁸.

Si analizamos el cuadro n.º 3, la superficie de cultivo de la cebolla en la campaña 1.973/74 era de 1.000 has., es decir, un 4, 5%, y su rendimiento de 14.800 kgs./has., sin embargo en 1.980/81, a pesar que su superficie era mayor 1.310 has. (5, 9%), su rendimiento desciende a 11.750 kgs./has., para

6. Datos cedidos por el Servicio de Sanidad Vegetal en Lanzarote de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura en Las Palmas.

7. *Idem.*

8. GONZÁLEZ MORALES, A., y BETANCORT BETANCORT, A.: *Op cit* (pág. 56).

volver a ascender en 1.985/86 con 1.380 has. (7, 2%), y obteniendo en esta ocasión 17.000kg./has.. Por último, en 1.992/93 disminuye considerablemente su superficie a 500 has. (2, 2%), pero aumenta su rendimiento a 13.700 kgs./has.. Es importante observar como a menor volumen se obtienen mayores rendimientos y mejora el resultado general.

Cuadro n.º 3
El cultivo de la cebolla en la Isla de Lanzarote

	Superficie (has.)	%	Rendimiento Kgs./Ha.	%
1973/74	1.000	4,5	14.800	6,4
1974/75	1.000	4,5	—	—
1975/76	1.100	4,9	9.400	4,0
1976/77	1.245	5,6	5.250	2,2
1977/78	1.381	6,2	13.500	5,8
1978/79	1.300	5,8	13.000	5,6
1979/80	1.563	7,0	15.900	6,8
1980/81	1.310	5,9	11.750	5,0
1981/82	1.400	6,3	5.150	2,2
1982/83	1.400	6,3	3.000	1,3
1983/84	1.325	5,9	7.000	3,0
1984/85	1.615	7,2	13.380	5,8
1985/86	1.380	6,2	17.000	7,3
1986/87	1.150	5,1	2.750	1,1
1987/88	840	3,7	17.500	7,5
1988/89	625	2,8	16.500	7,1
1989/90	515	2,3	15.500	6,7
1990/91	860	3,8	22.000	9,5
1991/92	620	2,8	13.500	5,8
1992/93	500	2,2	13.700	5,9
Total	22.129	100	230.580	100

Fuente: *Servicio de Sanidad Vegetal en Lanzarote de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura en Las Palmas. Delegación del Gobierno de Lanzarote. Elaboración propia.*

En definitiva, podemos afirmar que en el agro conejero se encuentran de un lado, aquellas explotaciones familiares (forma de producción precapitalista) que producen para su propio abastecimiento y de otro las explotaciones a caballo entre la forma de producción subcapitalista-capitalista, destinadas al cultivo de exportación.

Fuerteventura y Lanzarote son dos islas muy homogéneas, con algunas mínimas diferencias, pero iguales en el escaso rendimiento y baja productividad del sector primario que queda minorizado frente a otros sectores, el terciario, por lo que aparece un nuevo fenómeno, una nueva manera de trabajar las tierras, estamos refiriéndonos a «la agricultura a tiempo parcial».

4. CONCLUSIONES

Después de analizar los distintos sistemas y técnicas de cultivo podemos afirmar que Lanzarote y Fuerteventura padecen la misma crisis de subsistencia con respecto a la agricultura.

Bien es cierto, que Lanzarote por sus especiales características físico-ambientales, hacen que su espacio agrario se diferencie del resto del conjunto regional. Ahora bien, tanta importancia o más, tienen la articulación de los modos de producción que se desarrollan en la Formación Social Conejera (ocurre lo mismo para Fuerteventura), donde el modo de producción capitalista domina y determina sobre el resto —precapitalista y subcapitalista—.

Ya señalamos con anterioridad que las dos agriculturas —secano y regadío— están muy ligadas, aunque el secano esté orientado siempre hacia una agricultura de autoabastecimiento y las explotaciones de regadío orientadas hacia el mercado exterior, pues esto es debido a las diversas formas de producción, que como ya hemos mencionado, es el modo de producción capitalista el que establece las pautas con el resto, controlando los circuitos de distribución y comercialización. Pero de alguna manera, estos tres tipos de agricultura no están desarticulados entre sí, pues éstos forman parte y están perfectamente articulados en la Formación Social Canaria.

Para el agro conejero, la extensión superficial de los modos de producción precapitalista y subcapitalista no sólo es mayor con respecto al capitalista, sino de una gran importancia, donde el primero se refiere a la subsistencia de la familia campesina y el otro a la comercialización y exportación de sus productos —el producto agrícola más importante que se exporta es la cebolla—. El proceso productivo de este último y la escasez de medios hace que tengamos que hablar de una forma de producción a caballo entre la primera y la última.

En el agro majorero encontramos una agricultura de secano (agricultura de subsistencia) y las explotaciones de regadío (agricultura orientada hacia el mercado exterior), de menor extensión superficial que la primera, pero donde domina de forma absoluta el modo de producción capitalista con el cultivo del tomate que se exporta, y además la alfalfa que se consume en el interior, aunque también se exporta una vez seca y empacada, a otras islas.

El paisaje agrario conejero y majorero, pueden tener gran futuro económico con la técnica del arenado en general, y para los campos de Fuerteventura en particular, junto al sistema de riego por goteo, constituyen un elemento innovador para dichos campos.

Las Formaciones Majoreras y Conejeras no constituyen casos aislados en el conjunto de la formación social regional, pero sí que mantienen una posición de auténtica periferia dentro del conjunto del Archipiélago, y son las

relaciones sociales y económicas, las que explican fundamentalmente el mal estado de la agricultura en las islas.